



Инструкции касательно диеты и медикаментов при диабете для процедуры эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта

Нижеприведенная информация касается рекомендаций касательно диеты и медикаментов для наших пациентов с диабетом, проходящих процедуры эндоскопии. Позвоните нам, если у вас есть вопросы в отношении данных утверждений. В зависимости от вашей конкретной ситуации мы можем направить вас обратно к вашему врачу общей практики или эндокринологу для получения дальнейших инструкций.

Для людей с диабетом любые процедуры, из-за которых нужно будет пропускать приемы пищи или изменять обычный образ питания, потребуют специального планирования для безопасного поддержания уровня сахара в крови.

- Запланируйте прием на утро, чтобы вы смогли после него поесть и принять свой медикамент во время, максимально близкое к привычному.
- Проверяйте свой уровень глюкозы в крови перед всеми приемами пищи и перед сном в день подготовки и в день проведения процедуры.
- Проверяйте свой уровень глюкозы в крови, если в какое-либо время у вас появятся симптомы низкого или очень высокого уровня глюкозы в крови.

Откорректируйте прием своих противодиабетических медикаментов в ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ следующим образом:

Не компенсируйте и не удваивайте какие-либо пропущенные медикаменты после процедуры.

Если вы принимаете:	Утро
Актос (пиоглитазон), Актоплюс Мет (пиоглитазон и метформин), Авандия, Авандамет, Баета, Форксига, Глюкофаж (метформин), Инвокана, Джанувия, Джанумет, Несина, Онглиза, Траджента	Примите свою обычную дозу
Амарил (глимепирид), Авандарил, ДиаБета, Глиназ, Микроназ (глибурид), Дуэтакт (пиоглитазон и глимепирид), Глюкотрол, Глюкотрол XL (глипизид), Глюкованс (глибурид и метформин), Джардианс, Метаглип (глипизид и метформин HCl), Прандин (репаглинид), Старликс (натеглизид), Виктоза	Не принимайте
Лантус, Левемир	Примите ½ обычной дозы
Хумалог, Новолог, обычный инсулин или инсулин НПХ. Если вы используете дозу инсулина в зависимости от уровня гипергликемии, можете продолжать использовать эту схему.	Не принимайте
Предварительно смешанный инсулин 75/25, Новолин 70/30 или Новолог Микс 70/30	Не принимайте
Инсулиннезависимый инъекции: Bydureon (exenatide), Tanzeum (albiglutide), Trulicity (dulaglutide)	Примите только если еженедельная доза обусловлена в течение этого времени.