



혈액 응고 방지제 환자 지침

혈액 응고 방지제를 복용 중이신 경우, 시술을 진행하기 전에 혈액 응고 방지제(심장 발작, 뇌졸중, 혈전 또는 혈관 협소화를 방지하는 약물)의 복용을 중단하도록 요청 받으시게 됩니다. 시술을 진행하기 전에 귀하의 약물을 처방한 의사에게 이러한 약물의 복용을 중단해야 한다고 반드시 알려주십시오. 시술이 완료되면 위장병전문의가 귀하의 약물 복용을 다시 시작해야 하는 방법에 대한 지침을 제공해 드릴 것입니다. 시술이 진행되기 전에 이러한 약물의 복용을 중단하는 이유는 시술이 진행되는 동안 수행되는 생검과 관련된 출혈 위험을 줄이기 위한 것입니다.

****아스피린을 복용 중이신 경우에는 주치의가 별도로 지시하지 않는 이상 계속 복용하셔야 합니다.****

다음은 혈액 응고 방지제의 목록입니다.

항혈소판제:

플라빅스(클로피도그렐): 이 약물은 시술이 진행되기 5일 전에 복용하지 마십시오.

브릴린타(티카그렐로르): 이 약물은 시술이 진행되기 5일 전에 복용하지 마십시오.

에피엔트(파라수그렐): 이 약물은 시술이 진행되기 7일 전에 복용하지 마십시오.

아그레녹스(디피리다몰-아스피린): 이 약물은 시술이 진행되기 3일 전에 복용하지 마십시오.

로베녹스(영화 에녹사파린): 시술이 시작되기 전 아침에 정상 투여량을 복용하셔도 됩니다. 저녁 투여량을 복용하시는 경우, 약물을 처방한 의사에게 연락하셔서 자세한 지침을 받으십시오.

항혈전제:

쿠마딘/와파린: 이 약물은 시술이 진행되기 5일 전에 복용하지 마십시오.

파라닥사(다비가트란): 이 약물은 시술이 진행되기 2일 전에 복용하지 마십시오.

자렐토(리바록사반): 이 약물은 시술이 진행되기 2일 전에 복용하지 마십시오.

엘리퀴스(아픽사반): 이 약물은 시술이 진행되기 2일 전에 복용하지 마십시오.

**** 만성 신장 질환이 있는 경우 약물을 처방한 의사에게 연락하셔서 시술 전에 2일을 초과하여 파라닥사, 자렐토 또는 엘리퀴스의 복용을 중단하셔야 하는지 상의하십시오. ****

다음 경우에 저희 사무실로 전화해 주십시오.

- 상기 목록에 복용하고 계시는 약물이 없습니다.
- 해당되는 약물의 복용을 지정된 시간동안 중단하지 않으셨습니다.
- 질문이나 우려 사항이 있습니다.