



**Gastroenterology**

Specialty Medicine with Commitment, Care and Compassion

## 服用血液稀释剂的患者须知

如果您正在服用血液稀释剂（一种防止心脏病发作、中风、血凝块形成或血管变窄的药物），您将需要在接受检查前停止服用该药物一小段时间。请务必告知为您开药的医生您需要在接受检查前停止服药。在您完成检查后，您的胃肠病医生将给出重新开始服药的指示。在接受检查前停止服用这类药物的原因是降低与在您接受检查期间进行的活检相关的出血风险。

**\*\*如果您在服用阿司匹林，则您应该继续服用此药物，除非您的医生另有指示\*\***

以下是血液稀释药物的列表：

### 抗血小板药物：

**PLAVIX（氯吡格雷）**：检查前 5 天内不要服用此药物。

**BRILINTA（替卡格雷）**：检查前 5 天内不要服用此药物。

**EFFIENT（普拉格雷）**：检查前 7 天内不要服用此药物。

**AGGRENOX（双嘧达莫-阿司匹林）**：检查前 3 天内不要服用此药物。

**LOVENOX（依诺肝素钠）**：您可以在检查前一天的早晨按常规剂量服用。如果您要服用晚上的剂量，请联系您的处方医生获取进一步指示。

### 抗血栓药物：

**COUMADIN/华法林**：检查前 5 天内不要服用此药物。

**PRADAXA（达比加群）**：检查前 2 天内不要服用此药物。

**XARELTO（利伐沙班）**：检查前 2 天内不要服用此药物。

**ELIQUIS（阿派沙班）**：检查前 2 天内不要服用此药物。

**\*\* 如果您患有慢性肾病，请联系您的处方医生讨论是否需要在检查前停止服用 Pradaxa、Xarelto 或 Eliquis 两天以上 \*\***

如果出现以下情形，请联系我们的诊所：

- 您未在清单上看到您服用的药物。
- 您忘记要暂停服用此药物一段适当的时间。
- 您有任何疑问或顾虑。