



Gastroenterology

Specialty Medicine with Commitment, Care and Compassion

## Instrucciones sobre el uso de agentes anticoagulantes para el paciente

Si usa un anticoagulante (fármaco que previene los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre o estrechamiento de los vasos sanguíneos), se le pedirá que deje de usarlo durante un período corto antes del procedimiento. Asegúrese de comunicarle al médico que le recetó el medicamento que tendrá que interrumpirlo antes del procedimiento. Después de que finalice el procedimiento, el gastroenterólogo le dará instrucciones para reiniciar el medicamento. El motivo para interrumpir estos medicamentos antes del procedimiento es disminuir el riesgo de sangrado relacionado con las biopsias que se realizan durante el procedimiento.

**\*\*Si usa ASPIRINA, DEBE SEGUIR USANDO este medicamento a menos que el médico indique lo contrario\*\***

La siguiente es una lista de medicamentos anticoagulantes:

### **MEDICAMENTOS DE INHIBICIÓN DE LA FUNCIÓN PLAQUETARIA:**

**PLAVIX (clopidogrel):** No use este medicamento durante los 5 días previos al procedimiento.

**BRILINTA (ticagrelor):** No use este medicamento durante los 5 días previos al procedimiento.

**EFFIENT (prasugrel):** No use este medicamento durante los 7 días previos al procedimiento.

**AGGRENOX (dipiridamola y aspirina):** No use este medicamento durante los 3 días previos al procedimiento.

**LOVENOX (enoxaparina sódica):** Puede usar la dosis habitual la mañana del día PREVIO al procedimiento. Si usa una dosis por las noches, comuníquese con el proveedor que lo recetó para recibir más instrucciones.

### **MEDICAMENTOS ANTITROMBÓTICOS:**

**COUMADIN/WARFARINA:** No use este medicamento durante los 5 días previos al procedimiento.

**PRADAXA (dabigatrán):** No use este medicamento durante los 2 días previos al procedimiento.

**XARELTO (rivaroxabán):** No use este medicamento durante 2 días antes del procedimiento.

**ELIQUIS (apixaban):** No use este medicamento durante 2 días antes del procedimiento.

**\*\*Si tiene una enfermedad renal crónica llame al médico que le recetó el medicamento para analizar la necesidad de interrumpir Pradaxa, Xarelto o Eliquis durante más de 2 días antes del procedimiento.\*\***

Llame a nuestro consultorio si:

- No ve en esta lista el medicamento que usa.
- Olvidó suspender este medicamento durante el tiempo adecuado.
- Tiene preguntas o preocupaciones.