



上消化道内窥镜检查的糖尿病饮食和用药说明

以下信息是为接受内窥镜检查的糖尿病患者提供的饮食和用药建议。如果您对 these 建议有任何疑问，请来电咨询。根据您的具体情况，我们可能会让您咨询您的初级医疗医师 (PCP) 或内分泌学家获取进一步说明

对于糖尿病患者而言，任何导致您误餐或改变您平时饮食计划的检查都需要专门计划以安全地管控血糖。

- 将检查预约在大清早，以便随后在尽可能接近平时的时间点吃饭和服药。
- 在准备日和检查当天的各餐次之前以及睡前测量您的血糖水平。
- 如果在任何时候您出现低血糖或极高血糖的症状，请测量您的血糖。

從透明流質飲食開始直到您的檢查，都要遵循這些說明。

調整您的糖尿病藥物：

检查后，不要对漏服药物进行补服或“加倍”服药。

检查当天：

如果您服用：	上午
Actos (吡格列酮)、Actoplus Met (吡格列酮和二甲双胍)、Avandia、Avandamet、Byetta、Farxiga、Glucophage (二甲双胍)、Invokana、Januvia、Janumet、Nesina、Onglyza、Tradjenta	按常规剂量服用
Amaryl (格列美脲)、Avandaryl、DiaBeta、Glynase、Micronase (格列本脲)、Duetact (吡格列酮和格列美脲)、Glucotrol、Glucotrol XL (格列吡嗪)、Glucovance (格列本脲和二甲双胍)、Jardiance、Metaglip (格列吡嗪和盐酸二甲双胍)、Prandin (瑞格列奈)、Starlix (那格列奈)、Victoza	请勿服用
Lantus (甘精胰岛素)、Levemir (地特胰岛素)	服用常规剂量的 ½
Humalog (赖脯胰岛素)、Novolog (门冬胰岛素)、普通胰岛素或 NPH 胰岛素。如果您采用滑动胰岛素注射法，则可继续使用。	请勿服用
预混胰岛素：75/25、Novolin 70/30 或 Novolog Mix 70/30	请勿服用
非胰岛素注射剂：Bydureon (exenatide), Tanzeum (albiglutide), Trulicity (dulaglutide)	只有當您的每週劑量在這段時間內到期才需服用。