

**患者的肠道准备至关重要！**  
**请仔细阅读说明**

制剂： CoLyte

<p><b>检查前 1 周</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>请购买</b>以下物品：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CoLyte 肠道制剂 - 从患者药房取药。</li> <li>○ 非处方 GasX 或二甲基硅油气体缓解剂。患者仅需使用 4 粒。这些有助于减少结肠气泡。</li> <li>○ 清流质饮食 - 请参考清流质饮食宣讲资料。</li> </ul> </li> <li>□ <b>安排司机</b>：如有其他替代交通计划，请安排司机以将患者载回或护送回家。患者将被注射镇静剂以便进行检查。因此，患者在检查后的次日晨起之前不得驾车。</li> <li>□ <b>停止食用</b>任何可见的种子、坚果或全谷物。如果去除果蔬种子，则患者仍可食用果蔬。检查前 7 天内请勿服用任何油基维生素（A、D、E 或 K、鱼油等）或补充剂。如果患者在检查前一周意外摄入，我们虽然可能不会取消患者检查，但这可能会影响患者的制剂质量。</li> <li>□ 如果患者患有<b>糖尿病</b>和或使用<b>处方血液稀释药物</b>，请参考宣讲资料。如果患者无此宣讲资料，请联系本诊所办公室获取。</li> </ul>
<p><b>检查前 1 天</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 患者晨起醒来后<b>即开始清流质饮食</b>。详见清流质饮食宣讲资料。</li> <li>□ <b>晨起时</b>：将 CoLyte 溶液瓶灌注饮用水，充分混合直至完全溶解，然后夜间冷藏降温。</li> <li>□ <b>下午 6:00</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 小时内饮用一半 CoLyte 混合液（64 盎司）。（约每 15 分钟饮用 8 盎司）。</li> <li>○ <b>服用 2 粒 GasX 胶囊。</b></li> </ul> </li> <li>□ 继续保持清流质饮食以保持水分摄入。</li> </ul>
<p><b>检查当日</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 患者晨起醒来后<b>继续清流质饮食</b>。</li> <li>□ <b>检查前 7 小时</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在接下来的 2 小时内，将剩余的一半 CoLyte 混合液（64 盎司）饮完。</li> <li>○ <b>服用 2 粒 GasX 胶囊。</b></li> </ul> </li> <li>□ <b>检查前 6 小时</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>停用所有香烟、电子烟、嚼烟及大麻。</b></li> </ul> </li> <li>□ <b>检查前 5 小时</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 在接下来的一小时内再饮用 3 杯 8 盎司的清流质。</li> </ul> </li> <li>□ <b>检查前 4 小时</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 请勿饮水/禁止经口进食 - 包括水、口香糖、硬糖或薄荷糖。</li> <li>○ <b>唯一例外情况</b>：患者如有不能提前 4-6 小时服用的重要药物，则可于检查前 2 小时内服用，但仅限一口水送服（不超过 2-3 匙）。</li> </ul> </li> <li>□ 如果患者排便一直存在异常，请拨打上方号码，以便上午 6 点后获得更多建议。</li> <li>□ <b>其他说明</b>：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 乘车回家。办理登记时确认。</li> <li>○ 保险卡和驾驶证。请勿携带贵重物品。</li> </ul> </li> </ul>