

患者的肠道准备至关重要！  
请仔细阅读说明

制剂： SuTab

<p><b>检查前 1 周</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 请购买以下物品：             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 患者药房提供的 SuTab 肠道制剂处方。</li> <li>○ 非处方 GasX 或二甲基硅油气体缓解剂。患者仅需使用 4 粒。这些有助于减少胃肠道气泡，从而提高检查质量。</li> <li>○ 清流质饮食 - 请参考清流质饮食宣讲资料。</li> </ul> </li> <li>□ <b>安排司机：</b>如有其他替代交通计划，请安排司机以将患者载回或护送回家。患者将被注射镇静剂以便进行检查。因此，患者在检查后的次日晨起之前不得驾车。</li> <li>□ <b>停止食用</b>任何可见的种子、坚果或全谷物。如果去除果蔬种子，则患者仍可食用果蔬。检查前 7 天内请勿服用任何油基维生素（A、D、E 或 K、鱼油等）或补充剂。如果患者在检查前一周意外摄入，我们虽然可能不会取消患者检查，但这可能会影响患者的制剂质量。</li> <li>□ 如果患者患有<b>糖尿病</b>和或使用<b>处方血液稀释药物</b>，请参考宣讲资料。如果患者无此宣讲资料，请联系本诊所办公室获取。</li> </ul>
<p><b>检查前 1 天</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>请遵循本诊所办公室提供的准备说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 患者晨起醒来后即<b>开始清流质饮食</b>。详见清流质饮食宣讲资料。</li> <li>□ <b>下午 6:00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 开启 1 瓶 SuTab 片剂，用一小口水送服。在 20 分钟内饮完第一阶段 16 盎司的水。请勿切割或压碎片剂。</li> <li>○ <b>服用 2 粒 GasX 胶囊。</b></li> </ul> </li> <li>□ 在接下来的一小时内，再<b>饮用两份 16 盎司的凉水/凉开水</b>。请勿咀嚼。             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 患者出现恶心或呕吐使，宜休息 15-30 分钟，然后继续饮水。</li> </ul> </li> <li>□ 继续保持清流质饮食以保持水分摄入。</li> </ul>
<p><b>检查当日</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 患者晨起醒来后<b>继续清流质饮食</b>。</li> <li>□ <b>检查前 6 小时：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>停用所有香烟、电子烟、嚼烟及大麻。</b></li> <li>○ 开启 1 瓶 SuTab 片剂，用一小口水送服。在 20 分钟内饮完第一阶段 16 盎司的水。</li> <li>○ <b>服用 2 粒 GasX 胶囊。</b></li> <li>○ 接下来的一小时内，再饮用两份 16 盎司的凉水/凉开水。</li> </ul> </li> <li>□ <b>检查前 4 小时：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 请勿饮水/禁止经口进食 - 包括水、口香糖、硬糖或薄荷糖。</li> <li>○ <b>唯一例外情况：</b>患者如有不能提前 4-6 小时服用的重要药物，则可于检查前 2 小时内服用，但仅限一口水送服（不超过 2-3 匙）。</li> </ul> </li> <li>□ 如果患者排便一直存在异常，请拨打上方号码，以便上午 6 点后获得更多建议。</li> <li>□ <b>其他说明：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 乘车回家。办理登记时确认。</li> <li>○ 保险卡和驾驶证。请勿携带贵重物品。</li> </ul> </li> </ul>