

**SU PREPARACIÓN INTESTINAL ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE
LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Preparación: CoLyte 2 días

<p>1 semana antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compre lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Preparación intestinal CoLyte: recójalo en la farmacia. <input type="radio"/> GasX o un antiácido con simeticona (venta libre). Solo necesita 4 comprimidos. Ayudan a reducir las burbujas en el colon. <input type="radio"/> Líquidos claros: consulte el folleto sobre la dieta de líquidos claros. <input type="checkbox"/> Prevea contar con un conductor: debe contar con alguien que lo lleve a casa o lo acompañe si usa transporte alternativo. Usted estará sedado para el procedimiento. No debe conducir hasta la mañana siguiente del procedimiento. <input type="checkbox"/> Deje de comer semillas, nueces o granos enteros visibles. Puede seguir comiendo frutas y verduras si les retira las semillas. Consulte el folleto de pautas dietéticas. No tome vitaminas o suplementos con base oleosa (A, D, E, K, aceite de pescado, etc.) durante los 7 días previos al procedimiento. Si las toma accidentalmente, no se cancelará su procedimiento, pero puede afectar la calidad de la preparación. <input type="checkbox"/> Suspenda el consumo de drogas ilícitas al menos 7 días antes del procedimiento. De lo contrario, el procedimiento podría ser cancelado. <input type="checkbox"/> Si toma medicamentos recetados, consulte el folleto Cambios en medicamentos para conocer las instrucciones de suspensión. Si no lo recibió, comuníquese con nuestra centro.
<p>2 días antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inicie la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. Consulte el folleto correspondiente. <input type="checkbox"/> Beba abundantes líquidos claros durante todo el día para mantenerse hidratado.
<p>1 día antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Continúe con la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. Consulte el folleto correspondiente. <input type="checkbox"/> Por la mañana: llene el recipiente de CoLyte hasta la línea con agua del grifo; mezcle hasta que se disuelva completamente y refrigere la mezcla hasta la noche. <input type="checkbox"/> A las 6:00 p. m.: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beba la mitad de la mezcla de CoLyte (64 oz) en un lapso de 2 horas. (8 oz cada 15 minutos). <input type="radio"/> Tome 2 comprimidos de GasX. <input type="checkbox"/> Siga hidratándose con líquidos claros.
<p>Día del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Continúe con la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. <input type="checkbox"/> 7 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beba la mitad restante de la mezcla de CoLyte (64 oz) en las siguientes 2 horas. <input type="radio"/> Tome 2 comprimidos de GasX. <input type="checkbox"/> 6 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Deje de consumir cigarrillos, cigarrillos electrónicos, tabaco masticable y marihuana. <input type="checkbox"/> 5 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Beba 3 vasos de 8 oz de líquidos claros durante la próxima hora. <input type="checkbox"/> 4 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> NO INGIERA NADA MÁS: ni agua, ni chicle, ni caramelos o mentas. <input type="radio"/> Excepción: Si tiene un medicamento crucial que no se puede tomar con entre 4 y 6 horas de anticipación, puede tomarlo hasta 2 horas antes del procedimiento CON SOLO UN SORBO DE AGUA (2 o 3 CUCHARADAS). <input type="checkbox"/> Si una hora después de terminar la preparación no puede ver el fondo del inodoro, llame al número indicado en su instructivo para recibir asistencia, disponible después de las 7:00 a. m. <input type="checkbox"/> Considere lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Tenga previsto un transporte para regresar a casa. Esto se confirmará en el registro. <input type="radio"/> Traiga sus tarjetas de seguro médico y su licencia de conducir. No traiga objetos de valor.