

**SU PREPARACIÓN INTESTINAL ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE
LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Preparación: SuFlave

<p>1 semana antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compre lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Preparación intestinal SuFlave: recójala en su farmacia. Si su seguro no la cubre, no la compre y comuníquese con nuestro centro para conocer otras opciones. ○ GasX o un antiácido con simeticona, de venta libre. Solo necesita 4 comprimidos. Ayudan a reducir las burbujas en el colon. ○ Líquidos claros: consulte el folleto sobre la dieta de líquidos claros. <input type="checkbox"/> Prevea contar con un conductor: debe contar con alguien que lo lleve a casa o lo acompañe si usa transporte alternativo. Usted estará sedado para el procedimiento. No debe conducir hasta la mañana siguiente del procedimiento. <input type="checkbox"/> Deje de comer semillas, nueces o granos enteros visibles. Puede seguir comiendo frutas y verduras si les retira las semillas. Consulte el folleto de las pautas dietéticas. No tome vitaminas ni suplementos a base de aceite (A, D, E o K, aceite de pescado, etc.) durante los 7 días previos a su procedimiento. Aunque no cancelaremos el procedimiento si los consume accidentalmente, esto puede afectar la calidad de la preparación. <input type="checkbox"/> Suspenda el consumo de drogas ilícitas al menos 7 días antes del procedimiento. De lo contrario, el procedimiento podría ser cancelado. <input type="checkbox"/> Si está tomando medicamentos con receta, consulte el folleto Cambios en medicamentos para conocer las instrucciones de espera. Si no lo recibió, comuníquese con nuestro centro.
<p>1 día antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inicie la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. Consulte el folleto correspondiente. <input type="checkbox"/> A las 5:00 p. m.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Agregue un sobre potenciador de sabor a un frasco de SuFlave y llénelo con agua tibia hasta la línea de llenado. Agite bien el frasco hasta que el polvo se disuelva por completo. Refrigere durante una hora. <input type="checkbox"/> A las 6:00 p. m.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beba 8 onzas de la solución cada 15 minutos hasta terminar el frasco. ○ Luego, beba 16 onzas adicionales de agua. ○ Tome 2 comprimidos de GasX. <input type="checkbox"/> Siga hidratándose con líquidos claros.
<p>Día del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Continúe con la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. <input type="checkbox"/> 7 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Agregue un sobre potenciador de sabor a un frasco de SuFlave y llénelo con agua tibia hasta la línea de llenado. Agite bien el frasco hasta que el polvo se disuelva por completo. Refrigere durante una hora. <input type="checkbox"/> 6 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deje de consumir cigarrillos, cigarrillos electrónicos, tabaco masticable y marihuana. ○ Beba 8 onzas de la solución cada 15 minutos hasta terminar el frasco. ○ Luego, beba 16 onzas adicionales de agua. ○ Tome 2 comprimidos de GasX. <input type="checkbox"/> 4 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ NO BEBA NI INGIERA nada por vía oral, ni tampoco agua, goma de mascar, caramelos duros o pastillas de menta. ○ Excepción: Si tiene un medicamento crucial que no se puede tomar con entre 4 y 6 horas de anticipación, puede tomarlo hasta 2 horas antes del procedimiento CON SOLO UN SORBO DE AGUA (2 o 3 CUCHARADAS).

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">❑ Si una hora después de terminar la preparación no puede ver el fondo del inodoro, llame al número indicado en su instructivo para recibir asistencia, disponible después de las 7:00 a. m❑ Considere lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">○ Tenga previsto un transporte para regresar a casa. Esto se confirmará en el registro.○ Traiga sus tarjetas de seguro médico y su licencia de conducir. No traiga objetos de valor. |
|--|---|