

## SPECIALTY MEDICINE, EXCEPTIONAL CARE

## 您的肠道准备非常重要! 请仔细阅读说明

肠道准备剂: S	uP	re	a
----------	----	----	---

肠道准备剂: SuPrep			
	□ 购买以下必需品:		
手术前1周	O SuPrep 肠道准备剂 - 从药房取药。如果该药不在您的保险承保范围内,请不		
	要购买,应联系我们的办公室寻求其他选择。		
	O GasX 或西甲硅油非处方排气药。您只需要服用 4 粒这些药物。这些药物有助		
	于减少胃肠道中的气泡,从而提高检查质量。		
	○ 清流质食物 - 请参阅 <b>清流质饮食手册</b> 。		
	□ <b>安排司机:</b> 请安排一个人开车送您回家,如果乘坐其他交通工具,则安排一个人护送		
	您。您将在手术中接受镇静剂注射。直到术后第二天早上,您才能再次开车。		
	□ 停止食用 任何可见的种子、坚果或全谷物。您仍然可以食用水果和蔬菜,前提是要		
	将它们的种子清除干净。请参阅 <b>饮食指南手册</b> 。在术前整整 7 天请不要使用油基维		
	生素/补充剂(维生素 A、D、E 或 K或者鱼油等)。如果您在术前一周不小心摄入了		
	这些禁忌物,我们可能不会取消您的手术,但这可能会影响您的肠道准备质量。		
	□ 在术前 7 天停止使用任何 <b>违禁药物</b> ,否则您的手术可能会被取消。		
	□ 如果您正在使用 <b>处方药</b> ,请参阅 <b>药物调整手册</b> 以了解停药说明。如果您没有收到此手		
	册,请联系我们的办公室。		
手术前1天	□ <b>从您醒来时开始遵循清流质饮食</b> 。请参阅清流质饮食手册。		
	□ 下午 6:00:		
	O 将一瓶 SuPrep 液体倒入 16 盎司的混合容器中。用凉水装满容器的剩余容积。		
	喝掉全部混合液。		
	○ 服用 2 粒 GasX 药丸。		
	<b>口在接下来的一个小时内再喝 两杯</b> 各 16 盘司的凉/冷水。不要大口猛灌。		
	o 如果您出现恶心或呕吐,请休息 15-30 分钟,然后继续喝肠道准备液。		
	□ 继续食用清流质食物以保持水分。		
	□从您醒来时开始 继续遵循清流质饮食。		
	口 术前 6 小时:		
	○ 停止使用任何香烟、电子烟、嚼烟和大麻。		
	O 将第二瓶 SuPrep 液体倒入 16 盎司的混合容器中。用凉水装满容器的剩余容积。		
	喝掉全部混合液。		
	O 服用 2 粒 GasX 药丸。		
	O 在接下来的一个小时内再喝两杯各 16 盎司的凉/冷水。		
手术当天	口 术前 4 小时:		
	○ 不得饮食 - 包括水、口香糖、硬糖/薄荷糖。		
	○ 唯一的例外: 如果您正在使用重要药物但无法提前 4-6 小时用药,则可以在术		
	前最多2小时用药,但只能喝一口水(不得超过2-3汤匙)。		
	□ 如果在您完成肠道准备后一小时,尿液仍不够清澈而无法看清厕所底部,那么请在早		
	上7点后拨打上述电话号码以获取进一步的建议。		
	□ 准备以下事项:		
	○ 搭车回家。将在办理手术登记时确认。		
	○ 携带保险卡和驾驶执照。不要带贵重物品。		