

**SU PREPARACIÓN INTESTINAL ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE
LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Preparación: SuPrep

<p>1 semana antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Compre lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Preparación intestinal SuPrep: recójala en su farmacia. Si su seguro no la cubre, no la compre y comuníquese con nuestro centro para conocer otras opciones. ○ GasX o un antiácido con simeticona (venta libre). Solo necesita 4 comprimidos. Estos ayudan a reducir las burbujas en el tracto gastrointestinal, lo que mejora la calidad de su examen. ○ Líquidos claros: consulte el folleto sobre la dieta de líquidos claros. ❑ Prevea contar con un conductor: debe contar con alguien que lo lleve a casa o lo acompañe si usa transporte alternativo. Usted estará sedado para el procedimiento. No debe conducir hasta la mañana siguiente del procedimiento. ❑ Deje de comer semillas, nueces o granos enteros visibles. Puede seguir comiendo frutas y verduras si les retira las semillas. Consulte el folleto de las pautas dietéticas. No tome vitaminas/suplementos a base de aceite (A, D, E o K, aceite de pescado, etc.) durante los 7 días previos a su procedimiento. Aunque no cancelaremos el procedimiento si los consume accidentalmente, esto puede afectar la calidad de la preparación. ❑ Suspenda el consumo de drogas ilícitas al menos 7 días antes del procedimiento. De lo contrario, el procedimiento podría ser cancelado. ❑ Si está tomando medicamentos con receta, consulte el folleto Cambios en medicamentos para conocer las instrucciones de espera. Si no lo recibió, comuníquese con nuestro centro.
<p>1 día antes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Inicie la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. Consulte el folleto correspondiente. ❑ A las 6:00 p. m.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vierta un frasco de SuPrep en el recipiente mezclador de 16 onzas. Complete con agua fría hasta la línea indicada. Beba toda la mezcla. ○ Tome 2 comprimidos de GasX. ❑ Beba dos recipientes adicionales de 16 onzas de agua fría durante la siguiente hora. No la beba demasiado rápido. <ul style="list-style-type: none"> ○ Si tiene náuseas o vómitos, haga una pausa de 15 a 30 minutos y luego continúe tomando la solución de preparación. ❑ Siga hidratándose con líquidos claros.
<p>Día del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Continúe con la dieta de líquidos claros desde el momento en que despierte. ❑ 6 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deje de consumir cigarrillos, cigarrillos electrónicos, tabaco masticable y marihuana. ○ Vierta el segundo frasco de SuPrep en el recipiente para mezclar de 16 oz. Complete con agua fría hasta la línea indicada. Beba TODA la mezcla. ○ Tome 2 comprimidos de GasX. ○ Beba dos recipientes más de 16 onzas de agua fría o helada durante la próxima hora. ❑ 4 HORAS antes del procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ NO BEBA NI INGIERA nada por vía oral, ni tampoco agua, goma de mascar, caramelos duros o pastillas de menta. ○ Excepción: Si tiene un medicamento crucial que no se puede tomar con entre 4 y 6 horas de anticipación, puede tomarlo hasta 2 horas antes del procedimiento CON SOLO UN SORBO DE AGUA (2 o 3 CUCHARADAS).

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">❑ Si una hora después de terminar la preparación no puede ver el fondo del inodoro, llame al número indicado en su instructivo para recibir asistencia, disponible después de las 7:00 a. m.❑ Considere lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">○ Tenga previsto transporte para regresar a casa. Esto se confirmará en el registro.○ Traiga sus tarjetas de seguro médico y su licencia de conducir. No traiga objetos de valor. |
|--|---|