

장 청소 용액은 매우 중요합니다!
설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

준비용액: SuTab

1주일 전	□ 다음을 구입하십시오. ○ 약국에서 구입하는 SuTab 장 청소용 처방약. ○ GasX 또는 시메티콘 가스 제거제 일반의약품. 이 중 4가지만 필요합니다. 이는 검사의 질을 향상시키는 GI관의 기포를 줄이는 데 도움이 됩니다. ○ 맑은 액체 - 맑은 액체 식이요법 유인물을 참조하십시오. □ 운전자 계획: 대체 교통 수단을 이용하는 경우 귀하를 집으로 운전해서 데리고 가거나 부축해 줄 사람을 대기하도록 하십시오. 시술을 위해 진정제를 투여합니다. 시술 후 아침까지 다시 운전해서는 안 됩니다. □ 눈에 보이는 씨앗, 견과류 또는 통곡물 섭취를 중단하십시오. 씨앗을 제거하면 과일과 채소를 먹을 수 있습니다. 식이요법 지침 유인물을 참조하십시오. 시술 전 7일 동안 오일 성분 비타민/보충제(A, D, E 또는 K, 어유 등)는 복용하지 마십시오. 시술 일주일 전에 실수로 섭취한 경우 시술을 취소할 수 없지만, 이는 준비 상태에 영향을 미칠 수 있습니다. □ 시술 7일 전에는 불법 약물 사용을 중단하십시오. 그렇지 않으면 시술이 취소될 수 있습니다. □ 처방약을 복용하는 경우, 중단 지침에 대해서는 약물 변경 유인물을 참조하십시오. 이 유인물을 받지 못한 경우 당사 사무실로 연락해 주십시오.
1일 전	당사 사무실에서 제공한 프렘 지침을 따르시기 바랍니다. □ 기상 후 맑은 액체 식이요법을 시작합니다. 맑은 액체 식이요법 유인물을 참조하십시오. □ 오후 6:00 ○ SuTab 정제 1병을 열고 한 모금의 물과 함께 각 정제를 삼킵니다. 먼저 16온스 용기의 물을 20분 이내에 마십니다. 정제를 자르거나 깨뜨리지 마십시오. ○ GasX 정제 2정을 복용하십시오. □ 다음 시간 동안 16온스 용기의 냉수를 2번 더 마십니다. 급하게 마셔서는 안 됩니다. ○ 메스꺼움이나 구토가 발생하면 15~30분 정도 휴식을 취한 다음 액체를 계속 마십니다. □ 맑은 액체를 계속 섭취하여 수분을 유지합니다.
시술 당일	□ 기상 후 맑은 액체 식이요법을 계속합니다. □ 시술 6시간 전: ○ 담배, 전자 담배, 씹는 담배 및 마리화나 등의 모든 사용을 중단하십시오. ○ SuTab 정제 1병을 열고 한 모금의 물과 함께 각 정제를 삼킵니다. 먼저 16온스 용기의 물을 20분 이내에 마십니다. ○ GasX 정제 2정을 복용하십시오. ○ 냉수가 들어있는 16온스 용기를 다음 시간에 걸쳐 2번 더 마십니다.

	□ 시술 4시간 전: ○ 물, 껌, 딱딱한 사탕/민트 등 아무것도 마시지 않습니다. ○ 유일한 예외: 4~6시간 일찍 복용할 수 없는 중요한 약물이 있는 경우 시술 2시간 전까지 복용할 수 있지만 소량의 물(2~3테이블스푼 이하)로만 복용할 수 있습니다. □ 준비용액을 다 마시고 한 시간 이후에도 변기 바닥이 보일 정도로 맑지 않다면, 오전 7시 이후에는 위의 번호로 전화하여 자세한 상담을 받으시기 바랍니다. □ 다음에 준수해야 합니다. ○ 집까지 데려다 줄 보호자. 체크인 시 확인할 수 있습니다. ○ 보험 카드와 운전 면허증을 소지하십시오. 귀중품을 가져오지 마십시오.
--	---