

**VIỆC LÀM SẠCH RUỘT LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG!
VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN**

Thuốc Nhuận Tràng: SuTab

1 Tuần Trước Thủ Thuật	❑ Mua những loại thuốc sau: ○ Thuốc nhuận tràng kê đơn SuTab tại hiệu thuốc. ○ Thuốc giảm đầy hơi GasX hoặc simethicone không cần kê đơn. Quý vị sẽ chỉ cần 4 liều các loại thuốc này. Những loại thuốc này giúp giảm bọt khí trong đường tiêu hóa và cải thiện chất lượng xét nghiệm. ○ Chất lỏng trong suốt – Tham khảo tài liệu chế độ ăn chất lỏng trong suốt. ❑ Lên kế hoạch đưa đón: Lên kế hoạch để một người nào đó chở quý vị về nhà hoặc đi cùng quý vị nếu sử dụng phương thức vận chuyển thay thế. Quý vị sẽ được gây mê khi thực hiện thủ thuật. Quý vị nên ngừng lái xe cho đến buổi sáng hôm sau ngày thực hiện thủ thuật. ❑ Ngừng ăn các loại hạt, quả hạch còn nguyên hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Quý vị vẫn có thể ăn hoa quả và rau củ nếu bỏ hạt. Tham khảo tài liệu hướng dẫn chế độ ăn. Vui lòng không dùng vitamin dạng dầu (A, D, E hoặc K, dầu cá, v.v.) trong đủ 7 ngày trước khi thực hiện thủ thuật. Mặc dù chúng tôi có thể không hủy bỏ thủ thuật của quý vị nếu quý vị vô tình ăn những thực phẩm này vào tuần trước khi thực hiện thủ thuật, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng làm sạch ruột của quý vị. ❑ Ngừng sử dụng mọi loại thuốc bất hợp pháp 7 ngày trước khi quý vị thực hiện thủ thuật hoặc thủ thuật của quý vị có thể bị hủy bỏ. ❑ Nếu quý vị đang dùng thuốc kê đơn, vui lòng tham khảo tài liệu Thay Đổi Về Thuốc để được hướng dẫn cách tạm ngừng thuốc. Nếu quý vị không nhận được tài liệu này, hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi.
1 Ngày Trước Thủ Thuật	VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH RUỘT MÀ VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP ❑ Bắt đầu chế độ ăn lỏng trong suốt ngay khi quý vị thức dậy. Tham khảo tài liệu chế độ ăn chất lỏng trong suốt. ❑ Lúc 6:00 tối ○ Mở 1 lọ thuốc viên SuTab và nuốt từng viên thuốc với một ngụm nước. Uống hết 16 oz nước đầu tiên trong vòng 20 phút. Không cắt hoặc nghiền nát viên thuốc. ○ Uống 2 viên thuốc GasX. ❑ Trong một giờ tiếp theo, uống thêm hai chai nước mát/lạnh, mỗi chai 16 oz. Đừng uống liền một hơi. ○ Nếu quý vị cảm thấy buồn nôn hoặc nôn, hãy nghỉ ngơi 15-30 phút, sau đó tiếp tục uống chất lỏng. ❑ Tiếp tục uống chất lỏng trong suốt để đảm bảo cơ thể đủ nước.
Ngày Thực Hiện Thủ Thuật	❑ Tiếp tục chế độ ăn chất lỏng trong suốt ngay khi quý vị thức dậy. ❑ 6 GIỜ trước khi thực hiện thủ thuật: ○ Ngừng sử dụng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nhai và cần sa. ○ Mở 1 lọ thuốc viên SuTab và nuốt từng viên thuốc với một ngụm nước. Uống hết 16 oz nước đầu tiên trong vòng 20 phút. ○ Uống 2 viên thuốc GasX. ○ Uống thêm hai chai nước mát/lạnh, mỗi chai 16 oz trong một giờ tiếp theo. ❑ 4 GIỜ trước khi thực hiện thủ thuật: ○ KHÔNG ĂN/UỐNG bất cứ thứ gì - bao gồm nước, kẹo cao su, kẹo cứng/kẹo bạc hà. ○ Ngoại lệ duy nhất: Nếu quý vị có một loại thuốc quan trọng không thể uống trước 4-6 giờ, quý vị có thể dùng tối đa 2 giờ trước khi thực hiện thủ thuật, NHƯNG CHỈ VỚI MỘT NGỤM NƯỚC (không quá 2-3 THIA CANH). ❑ Nếu quý vị không thể thấy đầy bồn cầu một giờ sau khi hoàn thành làm sạch ruột, vui lòng gọi số trên sau 7 giờ sáng để được hướng dẫn thêm. ❑ Chuẩn bị những điều sau đây: ○ Xe đưa về nhà. Sẽ được xác nhận khi đến làm thủ tục. ○ Mang theo thẻ bảo hiểm và bằng lái xe. Không mang theo đồ vật có giá trị.