

장 청소 용액은 매우 중요합니다!
설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

상부 내시경 검사

시술일 준비	□ 맑은 액체 식이요법 유인물을 검토하고 필요에 따라 권장 품목을 구입하십시오. 이 유인물을 받지 못한 경우 당사 사무실로 연락해 주십시오. ○ 맑은 액체 식이요법은 시술 당일 오전 12:00(자정) 까지 시작되지 않습니다. □ 운전자 계획: 대체 교통 수단을 이용하는 경우 귀하를 집으로 운전해서 데리고 가거나 부축해 줄 사람을 섭외하십시오. 시술을 위해 진정제를 투여합니다. 시술 후 아침까지 다시 운전해서는 안 됩니다.
1주일 전	□ 시술 7일 전에는 불법 약물 사용을 중단하십시오. 그렇지 않으면 시술이 취소될 수 있습니다. □ 처방약을 복용하는 경우, 중단 지침에 대해서는 약물 변경 유인물을 참조하십시오. 이 유인물을 받지 못한 경우 당사 사무실로 연락해 주십시오.
시술 당일	□ 자정: ○ 지금부터 시술 4시간 전까지는 맑은 액체만 섭취할 수 있습니다. ○ 맑은 국물이나 맑은 단백질 음료와 같은 더 높은 단백질 옵션을 섭취할 수 있습니다. ○ 고형식품도 알코올도 안 됩니다. ○ 수분을 유지하는 것이 중요하므로 물이나 다른 맑은 액체를 충분히 섭취하십시오. □ 시술 6시간 전: ○ 담배, 전자 담배, 씹는 담배 및 마리화나의 모든 사용을 중단하십시오. □ 시술 4시간 전: ○ 물, 껌, 딱딱한 사탕/민트 등 어떠한 것도 드시지 마세요. ○ 위장에 액체, 심지어 다량의 타액이 들어가면 진정되는 동안 구토를 하고 폐에 체액이 흡입될 위험이 있습니다. ○ 유일한 예외: 4~6시간 일찍 복용할 수 없는 중요한 약물이 있는 경우 시술 2시간 전까지 복용할 수 있지만 소량의 물(2~3테이블스푼 이하)로만 복용할 수 있습니다. ○ 안전을 위해 이 절차를 따르지 않으면 시술이 취소되고 일정이 조정됩니다. 예외는 없습니다. □ 다음을 준수해야 합니다. ○ 집까지 데려다 줄 보호자. 체크인 시 확인할 수 있습니다. ○ 보험 카드 및 운전 면허증. 귀중품을 가져오지 마십시오.